

AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA  
OFICIUL FITOSANITAR DAMBOVITA

Nr. 16 din 24.04.2017

**BULETIN DE AVERTIZARE**

Conditile climatice din ultimele zile au favorizat aparitia si dezvoltarea daunatorului/bolii: Eurythoma schr., monilioza, ciuruire, patarea rosie a frunzelor, plum-pox, care poate/pot cauza pierderi importante la culturile:

PRUN

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului, numai pe parcelele pe care s-au realizat urmatoarele conditii:

- rezerva biologica daunatori si agenti patogeni;

Folositi unul din produsele sau amestecurile de mai jos, dupa caz:

- Karate Zeon – 0,15 l/ha (0,015%) + Captan 80 WDG – 1,5 kg/ha (0,15%);
- Calypso 480 SC – 0,2 l/ha (0,02%) + Dithane M 45 – 2 kg/ha (0,2%);
- Actara 25 WG – 0,1kg/ha (0,01%) + Signum – 0,5 kg/ha (0,05%);
- Decis 25 WG – 0,03 kg/ha (0,003%) + Folicur Solo – 0,75 – 1 l/ha (0,075 – 0,1%)

Tratamentul I se va aplica: - 25 – 29.04.2017

Tratamentul II se va aplica la un interval de 8 zile de la primul tratament;

Tratamentul se aplica pe timp linistit, fara vint.

Pentru protectia mediului inconjurator luati toate masurile ce se impun, respectati cu strictete frazele de risc inscrise pe ambalajul produselor de protectia plantelor.

Avind in vedere inceperea sezonului apicol activ, se impune necesitatea asigurarii protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide.

In conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse pentru protectia plantelor (pesticide), veti lua toate masurile ce va revin, mai ales in perioada de "inflorire" pentru a asigura protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

